

Εμβολιασμός, Νόσηση και Αναμνηστική δόση εμβολίου κατά του covid 19


Οδηγίες για τον εμβολιασμό ενηλίκων



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Περίπτωση 1^η



Νόσηση πριν τον
εμβολιασμό



1 δόση εμβολίου J&J



Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση
τουλάχιστον 3 μήνες μετά με μία δόση Pfizer,
J&J ή μισή δόση Moderna

Περίπτωση 2^η



Νόσηση πριν τον
εμβολιασμό



Εμβολιασμός με Pfizer,
Moderna ή AstraZeneca




Συστήνεται εμβολιασμός με αναμνηστική δόση
τουλάχιστον 3 μήνες μετά με μία δόση Pfizer,
J&J ή μισή δόση Moderna

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Περίπτωση 3^η



1^η δόση με Pfizer, Moderna ή AstraZeneca



Νόσηση μετά την 1^η δόση εμβολιασμό



Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer ή Moderna (ολόκληρη δόση) για ολοκλήρωση του εμβολιασμού



Αναμνηστική δόση συστήνεται 3 μήνες μετά από τη 2^η δόση με 1 δόση Pfizer, J&J ή Moderna μισή δόση

Περίπτωση 4^η



Ολοκλήρωση εμβολιασμού με J&J






Νόσηση μετά τον εμβολιασμό



Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά τη νόσηση με μια δόση Pfizer, μισή δόση Moderna ή J&J

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Περίπτωση 5^η



Ολοκλήρωση εμβολιασμού με δύο
δόσεις Pfizer, Moderna ή
AstraZeneca

Νόσηση μετά τον
εμβολιασμό

Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά
τη νόσηση με μια δόση Pfizer, J&J ή
μισή δόση Moderna



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού