

2^η Αναμνηστική δόση εμβολίου κατά του Covid-19 για άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών



Εθνική
Εκστρατεία
Εμβολιασμού

Δικαιούχοι της δεύτερης αναμνηστικής (4^{ης}) δόσης του εμβολίου κατά του κορωνοϊού

Οδηγίες για τον γενικό πληθυσμό:

Η ΕΕΕ προτείνει τη χορήγηση της 2^{ης} αναμνηστικής δόσης με mRNA εμβόλιο σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 μηνών μετά τη χορήγηση της πρώτης αναμνηστικής δόσης σε:



- άτομα ηλικίας άνω των 70 ετών
- άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών, ιδιαίτερα εκείνα με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα
- άτομα που διαμένουν σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

Για τον προγραμματισμό του ραντεβού σας για την 2^η αναμνηστική δόση, ακολουθείτε την ίδια διαδικασία που ακολουθήσατε για την πρώτη και τη δεύτερη δόση.

Σε άτομα που έχουν νοσήσει μετά τη χορήγηση της πρώτης αναμνηστικής δόσης, **δεν συστήνεται η χορήγηση δεύτερης αναμνηστικής δόσης.**

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση

Περίπτωση 1^η





Ολοκληρωμένος βασικός εμβολιασμός με 2 δόσεις Pfizer, Moderna ή AstraZeneca

Συστήνεται εμβολιασμός (πρώτη αναμνηστική δόση) τουλάχιστον 3 μήνες μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna

Προτείνεται εμβολιασμός με δεύτερη αναμνηστική δόση τουλάχιστον 4 μήνες μετά την πρώτη αναμνηστική δόση, με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna

Περίπτωση 2^η




Ολοκληρωμένος βασικός εμβολιασμός με 1 δόση J&J

Συστήνεται εμβολιασμός (πρώτη αναμνηστική δόση) τουλάχιστον 2 μήνες μετά με μία δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna


Προτείνεται εμβολιασμός με δεύτερη αναμνηστική δόση τουλάχιστον 4 μήνες μετά την πρώτη αναμνηστική δόση, με μία δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Περίπτωση 1^η




Νόσηση πριν τον
εμβολιασμό



1 δόση εμβολίου J&J




Συστήνεται εμβολιασμός με
πρώτη αναμνηστική δόση
τουλάχιστον 3 μήνες μετά με
μία δόση Pfizer, J&J ή μισή
δόση Moderna




Προτείνεται εμβολιασμός με
δεύτερη αναμνηστική δόση
τουλάχιστον 4 μήνες μετά την
πρώτη αναμνηστική δόση, με μία
δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna


Περίπτωση 2^η




Νόσηση πριν τον
εμβολιασμό



Εμβολιασμός με Pfizer,
Moderna ή AstraZeneca



Συστήνεται εμβολιασμός με
πρώτη αναμνηστική δόση
τουλάχιστον 3 μήνες μετά με μία
δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση
Moderna




Προτείνεται εμβολιασμός με
δεύτερη αναμνηστική δόση
τουλάχιστον 4 μήνες μετά την
πρώτη αναμνηστική δόση, με μία
δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση

Περίπτωση 3^η



1^η δόση με Pfizer,
Moderna ή
AstraZeneca



Νόσηση μετά την
1^η δόση εμβολίου



Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες
μετά τη νόσηση με μία δόση Pfizer
ή Moderna (ολόκληρη δόση) για
ολοκλήρωση του βασικού
εμβολιασμού




Πρώτη
αναμνηστική δόση
συστήνεται 3 μήνες
μετά από τη 2^η δόση
με μία δόση Pfizer,
J&J ή Moderna
μισή δόση




Προτείνεται
εμβολιασμός
(δεύτερη
αναμνηστική δόση)
τουλάχιστον 4 μήνες
μετά την πρώτη
αναμνηστική δόση,
με μία δόση Pfizer ή
μισή δόση Moderna

Περίπτωση 4^η



Ολοκλήρωση
εμβολιασμού με
J&J



Νόσηση
μετά τον
εμβολιασμό




Συστήνεται εμβολιασμός
(πρώτη αναμνηστική δόση) 3
μήνες μετά τη νόσηση με μια
δόση Pfizer ή J&J ή μισή δόση
Moderna




Προτείνεται εμβολιασμός (δεύτερη
αναμνηστική δόση) τουλάχιστον 4
μήνες μετά την πρώτη αναμνηστική
δόση με μία δόση Pfizer ή μισή δόση
Moderna

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση


Περίπτωση 5^η




Ολοκλήρωση εμβολιασμού με δύο δόσεις Pfizer, Moderna ή AstraZeneca



Νόσηση μετά τον εμβολιασμό




Συστήνεται εμβολιασμός 3 μήνες μετά τη νόσηση (πρώτη αναμνηστική δόση) με μια δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna



Προτείνεται εμβολιασμός (δεύτερη αναμνηστική δόση) τουλάχιστον 4 μήνες μετά την πρώτη αναμνηστική δόση, με μια δόση Pfizer ή μισή δόση Moderna


Περίπτωση 6^η



Ολοκλήρωση εμβολιασμού με δύο δόσεις Pfizer, Moderna ή AstraZeneca



Συστήνεται εμβολιασμός (πρώτη αναμνηστική δόση) 3 μήνες μετά με μια δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση Moderna



Νόσηση μετά τον εμβολιασμό




Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού δε συστήνει τον εμβολιασμό με 2^η αναμνηστική δόση.

Εμβολιασμός με αναμνηστική δόση & νόσηση


Περίπτωση 7^η



Ολοκλήρωση εμβολιασμού
με J&J



Συστήνεται εμβολιασμός (πρώτη
αναμνηστική δόση) 2 μήνες μετά
με μια δόση Pfizer, J&J ή μισή δόση
Moderna



Νόσηση μετά τον
εμβολιασμό



Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού δε
συστήνει τον εμβολιασμό με 2^η
αναμνηστική δόση.

