

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ	<ul style="list-style-type: none"> • Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων • Άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου 	Z94, T86
ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> • Υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση 	N18, N19, Y84.1
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΥΠΟ ΑΓΩΓΗ	<ul style="list-style-type: none"> • Κυστική Ίνωση • Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία)* • Αιματολογικός καρκίνος την τελευταία πενταετία** 	E84 C00 ως 97 (εκτός αιματολογικού καρκίνου) D37 ως D48 C81 ως C86, C88,C90 ως C95
ΣΟΒΑΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> • Χρόνιο αναπνευστικό νόσημα για το οποίο γίνεται χρήση οξυγόνου κατ' οίκον (βάσει πιστοποίησης ασφαλιστικού φορέα) • Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1 < 30% [FEV1: forced expiratory volume in 1st second] μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου • Διάμεση πνευμονοπάθεια 	J44 J84
ΣΟΒΑΡΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Πρόσφατο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (τους τελευταίους τρεις μήνες)*** • Καρδιακή ανεπάρκεια με κλάσμα εξώθησης <40% μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου (συμπεριλαμβανόμενων μυοκαρδιοπαθειών, συγγενών καρδιοπαθειών, βαλβιδικής νόσου) • Πνευμονική Υπέρταση 	I21 ως I23 I50 I27, I28
ΣΟΒΑΡΗ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Ηπατική ανεπάρκεια με πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος με πυλαία υπέρταση 	K72, K72.1, K72.9, K76.6, K74, K74.4, K74.5, K74.6, K70.3, K70.4
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ	<ul style="list-style-type: none"> • Αυτοφλεγμονώδεις/αυτοάνοσες παθήσεις ή άλλη νόσος υπό ανοσοκατασταλτική ή ανοσοτροποποιητική αγωγή μετρίου - υψηλού κινδύνου**** • Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες • HIV με CD4<200 κύτταρα/μL 	D80-D84
ΆΛΛΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ	<ul style="list-style-type: none"> • Σύνδρομο Down • Άλλες ειδικές καταστάσεις μετά από αίτηση του θεράποντος Ιατρού 	Q90

*Άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία για καρκίνο από 1/1/2020 • **Άτομα που έχουν διαγνωσθεί με αιματολογικό καρκίνο από 1/1/2016 • *** Άτομα με διάγνωση οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου από 1/12/2020 • **** Περιλαμβάνονται ασθενείς με ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις παθήσεις του γαστρεντερικού συστήματος (ιδιοπαθείς φλεγμονώδεις νόσοι του εντέρου), ήπατος (αυτοάνοση ηπατίτιδα), δέρματος (ψωρίαση, πομφολυγώδεις δερματοπάθειες), νεφρών (πρωτοπαθείς ή δευτεροπαθείς σπειραματικές παθήσεις) και μυοσκελετικού συστήματος – συνδετικού ιστού (ρευματοειδής αρθρίτιδα, Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος, αγγειίτιδες, μυοσίτιδες, σκληρόδερμα, Σ. Sjögren κλπ.) ή άλλη νόσο, οι οποίοι λαμβάνουν τη φαρμακευτική αγωγή του πίνακα που ακολουθεί.

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ / ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΙΟΥ - ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

	ATC CODE
ΓΛΥΚΟΚΟΡΤΙΚΟΕΙΔΗ	
Πρεδνιζολόνη, Μεθυλπρεδνιζολόνη (pos/IV)*	H02AB06, H02AB04
ΜΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	
Azathioprine (AZA)	L04AX01
Cyclophosphamide (CYC)	L01AA01
Cyclosporine (CsA)	L04AD01
Leflunomide (LEF)	L04AA13
Methotrexate (MTX)	L04AX03
6-mercaptopurine (6-MP)	L01BB02
Mycophenolate acid (MPA)	L04AA06
Mycophenolate mofetil (MMF)	L04AA06
Tacrolimus	L04AD02
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	
Abatacept	L04AA24
Anti-IL1 (Anakinra, Canakinumab)	L04AC03, L04AC08
Anti-IL6 (Tocilizumab)	L04AC07
Anti-IL12/23 (Ustekinumab)	L04AC05
Anti-IL17 (Brodalumab, Secukinumab)	L04AC12, L04AC10
Anti-TNFs (Adalimumab, Certolizumab pegol, Etanercept, Golimumab, Infliximab)	L04AB04, L04AB05, L04AB01, L04AB06, L04AB02
Belimumab	L04AA26
Anti-B cell (Rituximab)	L01XC02
Ixecizumab	L04AC13
Risankizumab	L04AC18
Guselkumab	L04AC16
Vedolizumab	L04AA33

*Πρεδνιζολόνη >20mg ημερησίως για διάστημα >30 ημερών ή 700mg συνολικής δόσεως σε 2 μήνες.
 Η αντιστοιχία των συχνότερων σε χρήση στεροειδών έχει ως εξής: • Prednisolone 5mg • Methylprednisolone 4mg
 • Dexamethasone 0,75 mg • Hydrocortisone 20mg • Betamethasone 0,6mg σε εβδομαδιαία χορήγηση

ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ / ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΜΕΤΡΙΟΥ - ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

	ATC CODE
ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΟΙ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ	
Apremilast	L04AA32
Αναστολείς JAK (Tofacitinib)	L04AA29
Αναστολείς JAK (Baricitinib)	L04AA37

*Πρεδνιζολόνη >20mg ημερησίως για διάστημα >30 ημερών ή 700mg συνολικής δόσεως σε 2 μήνες.
Η αντιστοιχία των συχνότερων σε χρήση στεροειδών έχει ως εξής: • Prednisolone 5mg • Methylprednisolone 4mg
• Dexamethasone 0,75 mg • Hydrocortisone 20mg • Betamethasone 0,6mg σε εβδομαδιαία χορήγηση

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ		ICD 10
ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Συγγενείς καρδιοπάθειες, υπέρταση με καρδιακές επιπλοκές, κοιλική μαρμαρυγή, χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια, μυοκαρδίτιδες, μυοκαρδιοπάθειες, συμπτωματική βαλβιδική νόσος, περιφερική αγγειακή νόσος, θρομβοεμβολική νόσος, ασθενείς με εμφυτεύσιμο απινιδιστή 	Q20 ως και Q26, I11, I13, I48, I24.8, I25, I40 ως και I43, I50, I51, I05 ως και I09, I34 ως και I37, I80 ως και I82 (εκτός του I80.0), I97.1, J81
ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 και τύπου 2 	E10 ως και E14
ΝΟΣΟΓΟΝΟΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ	<ul style="list-style-type: none"> • Δείκτης μάζας σώματος ≥ 40 kg/m² 	
ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> • Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (που δεν περιλαμβάνεται στην προηγούμενη κατηγορία), σοβαρό άσθμα με λήψη σε μόνιμη βάση κορτικοειδών από το στόμα ή βιολογικών παραγόντων, σύνδρομο υπνικής άπνοιας 	J44, J45, J96 G47.3
ΚΑΡΚΙΝΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Καρκίνος συμπαγούς οργάνου κατά την τελευταία 5ετία (που δεν περιλαμβάνεται στην προηγούμενη κατηγορία) 	C00 ως και C97 (εκτός C81 ως και C86, C88, C90 ως και C95) D37 ως D48
ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΟΛΗ	<ul style="list-style-type: none"> • Λοίμωξη HIV (με CD4>200 κύτταρα/μL) 	
ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΝΟΣΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Προχωρημένη χρόνια νεφρική νόσος, νεφρωσικό σύνδρομο 	N18.3, N18.4, N00 ως και N05
ΧΡΟΝΙΑ ΗΠΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Αντιρροπούμενη κίρρωση ήπατος 	K72.0, K74.0, K74.1, K74.2, K74.3, K70, K70.0, K70.1, K70.2 K70.9
ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ	<ul style="list-style-type: none"> • Ομόζυγη δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, ομόζυγη μεσογειακή αναιμία • Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορφύρα, θρομβωτική θρομβοπενική πορφύρα, παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία, απλαστική αναιμία 	D56, D57 D69.3, M31.1, D59.5, D61.0 έως και D61.9
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΠΛΗΝΟΣ	<ul style="list-style-type: none"> • Ασπληνία (περιλαμβάνεται και η λειτουργική ασπληνία) 	D73.0, Q89.0

Σημείωση: Οι κατάλογοι νοσημάτων υψηλού και αυξημένου κινδύνου των πινάκων 1,2 και 3 πρέπει να θεωρούνται προσωρινοί καθώς θα αναθεωρούνται με βάση τα διαθέσιμα κάθε φορά επιδημιολογικά και ιατρικά δεδομένα και τις θέσεις επιστημονικών ιατρικών εταιρειών και έγκυρων διεθνών οργανισμών δημόσιας υγείας.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ	ICD 10
ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ	I63, I64, G45, G80, G35 ως και G37, G40, G41, F00 ως και F03, G20 ως και G22, G30 ως και G32, G10 ως και G13, G60 ως και G63, G70 ως και G73
ΣΟΒΑΡΗ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ	F20 ως και F25, F31
ΣΟΒΑΡΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ	
ΓΟΝΕΙΣ Η ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 16 ΕΤΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ	

Σημείωση: Οι κατάλογοι νοσημάτων υψηλού και αυξημένου κινδύνου των πινάκων 1,2 και 3 πρέπει να θεωρούνται προσωρινοί καθώς θα αναθεωρούνται με βάση τα διαθέσιμα κάθε φορά επιδημιολογικά και ιατρικά δεδομένα και τις θέσεις επιστημονικών ιατρικών εταιρειών και έγκυρων διεθνών οργανισμών δημόσιας υγείας.

ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΥΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ	ΠΛΗΘΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ (ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)
ΚΑΡΔΙΑΣ	170
ΠΝΕΥΜΟΝΑ	50
ΝΕΦΡΟΥ	2.705
ΗΠΑΤΟΣ	250
ΣΥΝΟΛΟ	3.175
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ	11.722
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ	668
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	15.565